



# Grandes Cultures

désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et parasites

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



### BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°33 du 26 avril 2001 - 4 pages

## Désherbage maïs

Pour améliorer l'efficacité du désherbage et préserver la qualité de l'eau, un suivi des mauvaises herbes est mis en place en Bretagne.

Il a pour but de pouvoir préconiser à titre expérimental en 2000 des interventions ciblées sur les adventices selon leur stade de développement avec des herbicides au meilleur profil environnemental.

Cette opération réalisée en commun entre :

- la DRAF-SRPV

- et la FE.RE.DEC de Bretagne

bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.



Les observations sont réalisées par le réseau d'observateurs du SRPV Bretagne (SRPV, FEREDec, Chambre d'Agriculture, négoce, coopératives, lycées agricoles, agriculteurs,...) et sont synthétisées dans l'Avertissement Agricole par le SRPV Bretagne

Les informations sont reprises dans le bulletin d'avertissement agricole et disponibles sur le site Internet : <http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr>




Prochain  
bulletin : le 3  
mai 2001

## Observations hebdomadaires et préconisations en temps réel adaptées à la flore et à la qualité de l'eau

Après le suivi sur le blé, un suivi expérimental à l'échelle régionale sur le développement des adventices sera réalisé sur le maïs. L'objectif reste le même : préconiser des désherbants du groupe 1 (classement CORPEP) au meilleur profil environnemental pour la qualité de l'eau en fonction de l'évolution de la flore. Les parcelles seront suivies hebdomadairement.

La liste des produits homologués en prélevée et en post-levée sera présentée dans le prochain bulletin selon leur classement.



Protocole suivi de  
la flore sur maïs.

## Protocole de suivi pour les techniciens

(cf. schéma " Parcours d'observation de la flore adventice dans la parcelle de maïs ").

Pour les techniciens souhaitant participer au suivi hebdomadaire d'une ou plusieurs parcelles, notre protocole est le suivant.

Les observations sont réalisées sur quatre placettes positionnées au hasard dans la parcelle tout en recouvrant toute la surface. Chaque placette est matérialisée par des piquets pour permettre de réaliser les notations toujours au même endroit. Elles font une longueur de 10 m et placées dans le sens du semis.

Sur chaque placette, on note toutes les adventices présentes ainsi que le stade le plus représenté et le stade maximal (voir fiche de notation en annexe). Avant toute observation, il conviendra de remplir la fiche parcellaire (voir fiche en annexe). Ces observations sont à renvoyer au SRPV (fax 02 99 38 89 41) qui se charge de faire la synthèse.




# AVERTISSEMENTS Agricoles Bretagne

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



FICHE N°1 D'OBSERVATION DE LA FLORE  
ADVENTICE SUR LE MAÏS.  
CAMPAGNE DE MAÏS 2001







# AVERTISSEMENTS Agricoles Bretagne

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



## FICHE D'OBSERVATION DES STADES DES ADVENTICES DU MAÏS

Code parcelle (code attribué par le SRPV/FEREDec): :

Date :

Intervenant :

Stade du maïs :

Observation pour le bulletins n° (réservé au SRPV/FEREDec):

Placettes	Stade des adventices <sup>3</sup>									
	Placette 1		Placette 2		Placette 3		Placette 4		Moyenne des 4 placettes	
	SR <sup>2</sup>	SMax <sup>1</sup>	SR <sup>2</sup>	SMax <sup>1</sup>	SR <sup>2</sup>	SMax <sup>1</sup>	SR <sup>2</sup>	SMax <sup>1</sup>	SR <sup>2</sup>	SMax <sup>1</sup>
Chiendent rampant	1	1	1	1						
Digitaire filiforme										
Digitaire sanguine										
Panic dichotome										
Panic pied de coq										
Pâleurin annuel										
Ray-grass anglais										
Ray-grass d'Italie										
Sétaire glauque										
Sétaire verte										
Sétaire verticillée										
Amarante sp										
Arroche étalée										
Chénopode blanc										
Laiteron sp										
Lamier pourpre										
Liseron des haies										
Matricaire sp										
Mercuriale annuelle										
Morelle noire										
Renouée des oiseaux										
Renouée liseron										
Renouée persicaire										
Séneçon vulgaire										
Stellaire intermédiaire										

<sup>1</sup> - SMax = stade maximal observé sur la zone

<sup>2</sup> - SR = stade le plus représenté sur la zone

<sup>3</sup> - Stade des adventices :

0 absence

0.5 = stade cotylédonaire

1 = 1 feuille

2 = 2 feuilles

3 = 3 feuilles

4 = 4 feuilles


5 = tallage pour les graminées, rosette ou plus de 5 cm pour les dicotylédones

6 = bien développé

7 = en floraison

8 = production de graines

9 = plante sénescence



## AVERTISSEMENTS Agricoles Bretagne

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



### FICHE PARCELLAIRE OBSERVATION FLORE CAMPAGNE DE MAÏS 2001

Code parcelle :

Date :

Intervenants :

code zone (réservé au SRPV/FEREDEC):

#### IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT

Nom et prénom : .....

Commune : .....

Tél. : .....

#### IDENTIFICATION DE LA PARCELLE

Date de semis : .....

Précédent : .....

Variété : .....

Labour : OUI (date : ..... ) / NON Autre technique.....

Préparation de sol.....

Date de la dernière préparation de sol : .....

Type de semis (direct, combiné...) :

.....

Désherbage : nom du produit, date et dose :

.....

.....

.....

.....

.....

Remarques éventuelles :

.....